

LAS AVES
MIGRATORIAS

FADWA DAOUAIRI

KAWTAR SOUKARI

Belen de la Moneda

Sergio Arriaga Ballestero



RELACIÓN ENTRE LA LAGUNA Y LAS AVES MIGRATORIAS

- El Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja se encuentra situado en la comarca de la Vega Baja del Segura, entre los municipios de Guardamar del Segura, Torrevieja, los Montesinos y Rojas. Se trata de un valioso humedal cercano a los Parques Naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola. Este conjunto de humedales forman un entorno natural de especial importancia para el ciclo biológico de muchas especies de aves, tanto residentes como migratorias.
- En este humedal alicantino hay gran cantidad de especies de aves de ruta migratoria. Por ese motivo, las Lagunas de la Mata y Torrevieja, además de ser Parque Natural, gozan de otras figuras de protección internacional: pertenecen a la Conferencia Ramsar y son Zona de Especial Protección Paralas Aves (ZEPA).



El grado de salinidad afecta de forma importante a la artemia salina, pequeño crustáceo que es la base de la alimentación de la avifauna propia de los humedales hipersalinos, normalmente la alta salinidad que suele registrar la laguna de Torrevieja, impide la proliferación de artemia salina, lo que limita la presencia de avifauna. En cambio en la laguna de La Mata, con una menor salinidad, suele acoger a un mayor número de aves. Ya hace años que cíclicamente se registra una llamativa escasez de aves en la laguna de La Mata, ligada a una elevada salinidad y provocada por unos niveles bajos de agua con el objetivo de aumentar la producción salinera. Tras episodios de fuertes lluvias que hacen descender la salinidad, se produce un fuerte incremento de artemia y con él, la llegada de numerosas aves. La artemia salina en las lagunas, provoca que nos encontremos con estampas muy poco habituales, con bandos de flamencos, avocetas, zampullines cuellinegros, gaviotas picofinas, tarros blancos etc.. en la habitualmente desierta laguna de Torrevieja. Incluso en cantidades superiores a las registradas en la laguna de la Mata. Los fuertes vientos de poniente registrados durante este otoño, empujan a la artemia hasta la orilla este de la laguna, donde se forman verdaderas sopas de marisco, que son filtradas y picoteadas por numerosas aves. Como consecuencia de la alta salinidad hay pocos peces, destacando algunos ejemplares de mágil y de fartet.

RELACIÓN ENTRE LAS AVES Y LA VEGETACIÓN

- Las aves son importantes para la vegetación ya que dispersan las semillas que posteriormente serán árboles. Las aves comen los insectos, esto ayuda a los árboles a combatir plagas, a su vez los árboles son los lugares donde reposan y habitan los pájaros, ~~entonces unos~~ dependen de otros, se complementan entre ellos. En el parque natural, en la vegetación del monte encontramos el pino carrasco y el pino piñonero, existe una gran variedad de avifauna asociada a esta vegetación, como el alcaudón real, el verderón , y la cogujada . En los cultivos de viñedo del parque natural encontramos aves como el alcaraván y el chorlito dorado que se alimentan de uvas. El fumarel es una ave que acumula cañas sobre la vegetación subacuática hasta construir plataformas donde llevan a cabo la reproducción . En el interior de las lagunas la vegetación es casi inexistente debido a la gran salinidad, en los alrededores encontramos el saladar, que es una planta que soporta la salinidad. En la vegetación del saladar de la orilla de la laguna podemos encontrar una gran variedad de especies limícolas como el chorlitejo, el correlimos y la gaviota reidora.

Chorlitejo grande

- familia: Carádridos – Charadriidae Ave zancuda más bien pequeña de la familia de los carádridos. Un poco más grande que el chorlitejo chico, y tiene pico más corto y grueso, y solamente un anillo ocular amarillo poco definido (o ausente). Barras alares blancas muy notables en las aves en vuelo. Su Tamaño: Largo 17-19,5 cm, envergadura alar 35-41 cm, peso 49-64 g. Su Nido: En una depresión superficial en suelo arenoso o lleno de grava, con escaso material de nido (conchas, hojas de árboles, fragmentos de paja, grava etc.). Pone 4 huevos de abril a mayo, incubados por ambos padres durante 21 a 26 días. Los polluelos abandonan el nido poco después de salir del cascarón, y aprenden a buscar alimentos por sí mismos. Aprenden a volar entre los 21 y los 28 días. Los padres suelen fingir heridas para distraer a los depredadores, para alejarlos del nido. Se reproduce junto a costas abiertas y orillas de lagos. En Finlandia se pueden observar aves de dos razas: la raza nominal C. h. hiaticula_ en costas, y una raza nortea (C. h. tundrae_) tierra adentro en el norte de Finlandia. La población reproductora finlandesa se estima en 3.000 a 6.000 parejas. La raza nominal se ha vuelto cada vez más escasa en los últimos tiempos debido al crecimiento excesivo de praderas costeras. Migración: Pasa el invierno en Europa occidental y el oeste de África. Abandona Finlandia de julio a octubre, y regresa a partir de fines de marzo y Alimentación Pequeños invertebrados, insectos, arañas, babosas y caracoles. He tiene Un sonido suave de dos sílabas: “tül-li”. El chorlitejo grande se puede distinguir del chorlitejo chico similar por su mayor tamaño, barras alares blancas y pico más corto y grueso. Sus manchas faciales de color blanco son similares, aunque los extremos de su amplio antifaz son más redondeados y no hay una mancha blanca detrás de la raya negra que pasa por encima de su capuchón. Un amplio cinturón negro se extiende desde el pecho hacia los lados de su cuello. Su dorso es de color marrón arenoso, y las partes ventrales son blancas. Los ejemplares jóvenes del chorlitejo grande carecen de las manchas negras de la cara. Tienen coloración blanca en la frente, garganta y cuello, y solo una franja ocular de color marrón amarillento tenue. Las plumas del dorso tienen un borde angosto de color marrón herrumbre. Las patas del chorlitejo grande son de color naranja (en las aves adultas) o amarillo verdoso (en las aves jóvenes). Su pico es de color naranja con punta negra (en las aves adultas) o negro con base amarilla hasta la mandíbula inferior (en las aves jóvenes). El iris es de color marrón. El chorlitejo grande no tiene el anillo ocular que generalmente es visible en el chorlitejo chico.



Chorlito dorado

- El chorlito dorado es una especie migratoria, que pasa el invierno en el sur de Europa y el norte de África. El chorlito dorado europeo es un ave limícola de mediano tamaño, pico considerablemente corto y cuerpo voluminoso, que exhibe un plumaje ciertamente vistoso, con la cara, la garganta, el pecho y la región ventral de un intenso color negro, bordeado en toda su extensión por una franja blanca de variable amplitud. Los chorlitos dorados miden una media de longitud de 26 a 29 cm. y pesan entre 150 e 220 g. La envergadura de sus alas es de 67 ó 76 cm. Durante la época de cría los adultos tienen plumas doradas y negras en la cabeza, la espalda y las alas. En invierno pierden el plumaje negro y los chorlitos muestran un rostro amarillento y el pecho y el vientre blancos. Su hábitat de reproducción son los páramos y tundras del norte de Europa y el oeste de Asia. Anidan en el suelo en terrenos secos. Estas aves se alimentan en las tundras, campos, playas y marismas, normalmente atrapando su alimento mediante la vista. Se alimentan principalmente de pequeños insectos, crustáceos y otros invertebrados, aunque también comen bayas. En el parque suelen estar cerca de los cultivos de viñedo ya que se alimentan de las uvas.



Alcaudón común

- El alcaudón común (*Lanius senator*) es una especie de ave passeriforme perteneciente a la familia de los alcaudones (Laniidae). Cría principalmente en la cuenca mediterránea y sus cuarteles de invernada se encuentran en África, alrededor del Sahel. En murciano se le conoce como cacildrán. Se trata de un alcaudón de tamaño medio. Miden algo más de 19 cm, con unos 8 cm de cola, por lo que son algo mayores que los alcaudones dorsirrojos y pesan alrededor de 50 g, lo que supone un 10-20% más que los dorsirrojos. Se caracteriza por su voluminosa cabeza, teñida de rojo, y por su manto negro, con amplias manchas blancas en las alas. La cola es también negra, excepto en los bordes y en la base. El alcaudón común anida en el sudoeste de la región Paleártica, alrededor del Mediterráneo, en especial en la península ibérica donde se concentra el 85% de la población europea. El área principal se extiende de los países occidentales del Magreb, el sur de Portugal y la mayor parte de España, el sur y centro de Francia hasta Italia. Los cuarteles de invierno de la especie se extienden por los cinturones de sabana seca al sur del Sahara. Algunas aves desde las poblaciones de cría orientales pasan el invierno en el suroeste de la península arábiga, sobre todo el Yemen. El hábitat óptimo de la especie es los pastizales calcáreos del Mediterráneo con arbustos diseminados o árboles aislados, que ofrecen una amplia variedad de escarabajos, saltamontes y cigarras como alimento. Habitan con frecuencia en las maquias abiertas, los montes bajos con espinos, los encinares abiertos y los márgenes de bosques de pino piñonero y los sabinares. El alcaudón común, a diferencia de los demás alcaudones, se alimenta casi exclusivamente de insectos. Solo consume otros invertebrados o vertebrados de forma esporádica y en cantidades insignificantes. Su dieta se compone principalmente de grandes escarabajos, saltamontes, cigarras y grillos.



GOLONDRINA

- Las aves migratorias del parque natural son genéricamente hablando de un pequeño tamaño. A ejemplo podemos enfocarnos en la golondrina que no supera los 20 cm de longitud. Llegan en el mes de junio, los polluelos permanecen en el nido de 20 a 22 días. Sólo incuba la hembra, depositando 4 ó 5 huevos. Los polluelos, una vez que saben volar, se posan en fila sobre una rama, y se dejan alimentar, durante un tiempo. Después merodean por áreas de abundancia de comida. Es temporal, alrededor de 10.000 ejemplares son los que utilizan el carrizal de este parque para pernoctar, convirtiendo a dicho enclave en uno de los pocos en los que se dan tales concentraciones de estas aves. De aquí pegarán el salto directo dirección al sur. Su alimentación insectívora contribuye a los humanos. Depende de la vegetación baja, como pasturas y terrenos agrícolas y de la laguna. La presencia de estructuras abiertas y accesibles proporcionan sitios de nidificación. Las ramas desnudas para posarse también son importantes en la elección de esta ave de sus lugares de reproducción. Esta regulado por la ZEPA de España (Zonas de Especial Protección para las Aves)



AGUILUCHO CENIZO

- mide de 39-46cm. Aparecen a mediados de marzo y se quedan hasta finales de julio, La incubación dura unos 30 días, los primeros vuelos de los pollos tienen lugar 32 días tras la eclosión, y los pollos son dependientes de los padres durante unas tres semanas después de los primeros vuelos ,en ese momento abandonan las áreas de cría para dirigirse a sus zonas de invernación, la gran mayoría en el oeste africano Habita en zonas desarboladas como en los saladares o carrizales, es temporal puesto que su hábitat depende del balance entre calidad y cantidad de alimento obtenido y esfuerzo de captura es buena. su función es alimentarse de micromamíferos, grandes insectos, pequeños anfibios y reptiles y aves de pequeño tamaño, de esta manera se mantiene la cadena alimenticia estable. De zorros, jabalíes y otras rapaces puesto que sus nidos suelen sufrir una intensa depredación de estos animales, además la presencia humana, y el desarrollo de puestos transitables, es perjudicial para la nidificación del Aguilucho Cenizo. Simboliza una parte de la cadena alimenticia de la laguna de la mata Como no hay muchos ejemplares, pero si existen varios tipos de depredadores, su presencia en el parque no es muy relevante.

