

AVES MIGRATORIAS

LAGUNA DE LA MATA



Se trata de un valioso humedal cercano a los Parques Naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola. Este conjunto de humedales forman un entorno natural de especial importancia para el ciclo biológico de muchas especies de aves, tanto residentes como migratorias.




El grado de salinidad afecta de forma importante a la artemia salina, pequeño crustáceo que es la base de la alimentación de la avifauna propia de los humedales hipersalinos, normalmente la alta salinidad que suele registrar la laguna de Torrevieja, impide la proliferación de artemia salina, lo que limita la presencia de avifauna. En cambio en la laguna de La Mata, con una menor salinidad, suele acoger a un mayor número de aves.






LA VEGETACIÓN



Las aves son importantes para la vegetación ya que dispersan las semillas que posteriormente serán árboles.



Las aves comen los insectos, esto ayuda a los árboles a combatir plagas, a su vez los árboles son los lugares donde reposan y habitan los pájaros, entonces unos dependen de otros, se complementan entre ellos.



En el parque natural, en la vegetación del monte encontramos el pino carrasco y el pino piñonero, existe una gran variedad de avifauna asociada a esta vegetación, como el alcaudón real, el verderón , y la cogujada



COGUJADA



ALCAUDÓN REAL



VERDERÓN




ALCAUDÓN COMÚN



PINO CARRASCO



PINO PIÑONERO



ALCAUDÓN COMÚN



El alcaudón común (*Lanius senator*) es una especie de ave passeriforme perteneciente a la familia de los alcaudones (Laniidae).



El alcaudón común anida en el sudoeste de la región Paleártica, alrededor del Mediterráneo, en especial en la península ibérica donde se concentra el 85% de la población europea. El área principal se extiende de los países occidentales del Magreb, el sur de Portugal y la mayor parte de España, el sur y centro de Francia hasta Italia. Los cuarteles de invierno de la especie se extienden por los cinturones de sabana seca al sur del Sahara

El hábitat óptimo de la especie es los pastizales calcáreos del Mediterráneo con arbustos diseminados o árboles aislados, que ofrecen una amplia variedad de escarabajos, saltamontes y cigarras como alimento. Habitan con frecuencia en las maquias abiertas, los montes bajos con espinos, los encinares abiertos y los márgenes de bosques de pino piñonero y los sabinares.



El alcaudón común, a diferencia de los demás alcaudones, se alimenta casi exclusivamente de insectos. Solo consume otros invertebrados o vertebrados de forma esporádica y en cantidades insignificantes. Su dieta se compone principalmente de grandes escarabajos, saltamontes, cigarras y grillos.

En los cultivos de viñedo del parque natural encontramos aves como el alcaraván y el chorlito dorado que se alimentan de uvas. El fumarel es una ave que acumula cañas sobre la vegetación subacuática hasta construir plataformas donde llevan a cabo la reproducción




ALCARAVÁN



CHORLITO DORADO



FUMAREL



VIÑEDO

